

## Mischung "Indianersommer" (überarbeitet, Stand: 01/2006)

Farben: gelb - orange - weiß, für trockene Freiflächen und Straßeninseln, mittlere Pflanzenzahl: 8 Stück/ m<sup>2</sup>

Art	Funktion	verw.-relev. Eigenschaften	Stückzahl auf 100 m <sup>2</sup>	Anteil/%	Beschreibung	Alternative
<b>1. Gerüstbildner</b>		<b>11%</b>				
<i>Asclepias tuberosa ssp. interior</i>	Gerüstpflanze, Frühsommer-Aspektbildner	L, zS	25	3	orangefarbene Blüten im Juli-August, bildet mit der Zeit kompakte, 60 cm hohe Büsche, spät austreibend, schöne Samenstände, nördl. Herkünfte bevorzugen, für sandige Böden	<i>Asclepias tuberosa</i>
<i>Baptisia australis var. minor</i>	Gerüstpflanze	Sol, L, Cs	10	1	blaue Schmetterlingsblüten im Juni/ Juli, wachsig grau-grünes Laub, kleinwüchsige, trockenheitsverträglichere Unterart, 50 cm	<i>Baptisia australis</i>
<i>Helianthus occidentalis</i>		Sol	10	1	gelbe Blüten von Ende Juli bis September auf kaum beblätterten Stengeln, graziler Wuchs, bis 80-90 cm hoch, trockenheitsverträglich, kurze Ausläufer	
<i>Perovskia abrotanoides</i>			10	1	blauvioletter Blütenaspekt im Sommer, weißfilzige Triebe und Blätter, Halbstrauch	<i>Caryopteris x clandonensis</i>
<i>Schizachyrium scoparius</i>	Gerüstpflanze, Herbst-Aspektbildner	H, L, zS	25	3	horstiges Gras, spät austreibend, 60-80 cm blau-grünes Laub, orange-braune Herbstfärbung, silbrige Samenstände im Winter, sehr trockenheitsverträglich	<i>Panicum virgatum</i> 'Hänsel Herms', <i>Sporobolus heterolepis</i>
<i>Solidago rigida (= Oligoneuron rigidum)</i>	Gerüstpflanze	Sol	10	1	gelbe Blüte in flachen Scheindolden im August/ September, grob texturiertes Laub als Kontrast zu feinlaubigen Pflanzen, bildet langfristig buschige Form, 60-110 cm hoch, verträglich	<i>Solidago caesia</i> , <i>S. spaalata</i> 'Golden Fleece'
<b>2. Aspektbildner</b>		<b>59%</b>				
<i>Aster azureus (= Symphiotrichum oolentangiense)</i>	Spätsommer-Aspektbildner	zS	20	3	Spätsommer-Aspekt, blaue, feine Blüten im August-September, trockenheitsverträglich, wird nicht lästig, sät sich nur mäßig aus, lichtschatteverträglich, 60-80 cm hoch	<i>Aster amellus</i> 'Sternkugel', <i>Aster n.a.</i> 'Purple Dome'
<i>Bouteloua curtipendula</i>		H, zS	70	9	horstiges Gras, bis 90 cm, rötliche einseitige Ährchen ab Juni bis September, grau-grünes feines Laub, rötlich-bronze-farbene Herbstfärbung, trockenheitsverträglich	
<i>Coreopsis lanceolata</i> 'Sternaler'	Begleiter		25	3	gelbe Blüte im Juni-September, kompakte, reichblühende Samensorte, 50 cm hoch, sandige Böden, versamend	
<i>Coreopsis major</i>	Aspektbildner/ Begleiter	H	40	5	hellgelbe Blüten im Juli-September, 60-80 cm hoch, horstig, dunkelgrünes grob geteiltes Laub, orange Herbstfärbung	<i>Coreopsis verticillata</i> 'Grandiflora'
<i>Echinacea paradoxa</i>	Frühsommer-Aspektbildner	L, zS	80	10	Frühsommer-Aspekt, Korbblüte mit schmalen, gelben Zungenblüten im Juni/Juli, 60 cm hoch, schöne Samenstände im Winter	
<i>Eragrostis spectabilis</i>	Aspektbildner	H	30	4	horstiges Gras, bis 30 cm, purpurfarbene Blüten im August-September, violette Herbstf., kurzlebig, versamend	
<i>Liatris scariosa</i>	Solitärstreupflanze		30	4	gestielte, blauviolette Blüten im Juli/August, behaarte Stengel, bis 150 cm hoch, trockenheitsverträglich	<i>Liatris spicata</i>
<i>Linum perenne ssp. lewisii</i>		K, W	25	3	Vorsommer-Aspekt, ähnlich <i>L. perenne</i> , aber großblütiger und kompakter, kurzlebig, in Lücken versamend, wichtig in Neupflanzungen	<i>Linum perenne</i>
<i>Oenothera pilosella</i>	Frühsommer-Aspektbildner	W, H	30	4	Frühsommer-Aspekt, Partner zu <i>Echinacea paradoxa</i> , hellgelbe Blüten im Juni/Juli, durch kurze Ausläufer langsam flächig ausbreitend, purpur-röt. Herbstfärb., wintergrüne Rosetten	

<i>Penstemon digitalis</i>	Vorsommer-Aspektbildner	W, H	35	4	Vorsommer-Aspekt, weiß-rosa Blüte im Juni, 70-100 cm, wintergrüne Rosetten, rötliche Herbstfärbung, zierende Samenstände	<i>Penstemon digitalis</i> 'Husker's Red Strain'
<i>Rudbeckia missouriensis</i>		zS	40	5	Sommer-Aspekt, goldgelbe Korbblüte mit schwarzer Mitte, Juli-September, zierlicher Wuchs, 40 cm hoch, schmales Laub	<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i>
<i>Sporobolus heterolepis</i>	Begleiter/Herbst-Aspektbildner	H, L	50	6	Herbst-Aspekt/ Begleiter, horstiges Gras, sehr feine, lineale Blätter, süßduftende Blüten, 40/75 cm hoch, gelb-orange Herbst- und Winterfärbung	
<b>3. Begleiter</b>			<b>24%</b>			
<i>Agastache foeniculum</i>		zS	25	3	violettblaue Blüte im Juli/ August, 60-80 cm hoch, grau-weißl. Blattunterseiten, langlebiger als <i>A. rugosa</i> , schöne Samenstände im Winter	<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'
<i>Artemisia ludoviciana</i> var. <i>albula</i> 'Silver Queen'			10	1	auffälliges, weißfilziges Laub, bis 75 cm	
<i>Aster oblongifolius</i> (= <i>Symphiotrichon oblongifolium</i> )	Begleiter		10	1	blaue Blüten im August/September, lanzettliche, duftende Blätter, halbkugeliger Wuchs, kurz Rhizome, bis 60 cm, trockenheitsverträglich	<i>Aster</i> n.a. 'Purple Dome'
<i>Euphorbia corollata</i>		L, zS	15	2	weiße kleine Blüten in Dolden im August/September, schleierkrautartige Wirkung, 80-120 cm, typ. Prärieart, treibt Ausläufer, aber verträglich	<i>Gypsophila paniculata</i> , <i>Gaura lindheimeri</i>
<i>Monarda fistulosa</i> ssp. <i>fistulosa</i> var. <i>menthaefolia</i>	Begleiter		15	2	lilarosa Blüten Ende Juni bis Anfang August, 40-60 cm hoch, schöne, kugelige Samenstände weitgehend unbekanntes Unterart von <i>M. fistulosa</i> aus dem Westen der USA	
<i>Oligoneuron album</i> (= <i>Aster plaromicoides</i> )	Begleiter		50	6	weiße Blüte im Juni-August, lockerer, halbkugeliger Wuchs, horstig, bis 40 cm, trockenheitsverträglich, auch für sandige Böden	
<i>Penstemon hirsutus</i>		W	15	2	weiß-lila Blüte im Mai/ Juni, 30-40 cm, wintergrüne Rosetten, relativ kurzlebig, versamend	
<i>Pycnanthemum pilosum</i>		zS	15	2	weiße Lippenblüten Ende Juli bis September, graugrünes, Laub mit Minzeduft, 60-80 cm hoch, schöne Samenstände	
<i>Pycnanthemum tenuifolium</i>	Begleiter	Cs	35	4	weiße Lippenblüten im Juni-September, frischgrünes, nadelartiges Laub, kurze Rhizome, 30-50 cm, Samenstände zierend	
<b>4. Pendler</b>			<b>6%</b>			
<i>Gaillardia aristata</i> (Wildform)	Pendler		10	1	orange-gelbe Blüte im Juni-September, kurzlebig, 60 cm hoch, kurzlebig, versamend	
<i>Ratibida columnifera</i> var. <i>pulcherrima</i> (Rote Form)	Pendler		10	1	dunkelrote Blüten im Juni-September, geschlitztes, graugrünes Laub, kurzlebig, auf sandig-kiesigen Böden Selbstaussaat	<i>Ratibida columnifera</i>
<i>Rudbeckia hirta</i> (Wildform)	Pendler	zS	25	3	rot-braun gelbe Blüten im Juni-August, ein- bis zweijährig, selbstversamend, 50 cm hoch	
<b>Gesamt:</b>			800	100		
<b>5. Geophyten</b>						
<i>Narcissus triandrus</i> 'Hawera'	Streupflanze		600		hellgelbe kleine Blüte Mitte April bis Mitte Mai, 20 cm hoch, schmales Laub, später Austrieb, duftend, schön zu <i>Sporobolus</i> , Wiesenpflanze	
<i>Camassia quamash</i>	Streupflanze		800		ultramarinblaue Blüten Ende April bis Mitte Mai, 30 cm hoch, liebt frühjahrsfrische Standorte, in der Natur oft in Massen vorkommend, ausdauernd?	

<i>Crocus tommasinianus</i> 'Ruby Giant'	Streupflanze		800		purpurviolette Blüten im März/April, später als die Art, steril, nur vegetative Ausbreitung, schöne kräftige Blütenfarbe	
--	--------------	--	-----	--	--	--