

Mischung: "Präriesommer" (überarbeitet, Stand: 01/2006)

Bodenansprüche: vollsonnige Lage, durchlässiger Lehm / lehmiger Sand, mäßig trocken - mäßig frisch, mäßig nährstoffreich

Mulchschicht: Edelsplit 8/16, Eifellava 2/8 mm in einer Stärke von 5-7 cm

Wässern: im Einwachsyear nach Bedarf, danach kein Wässern mehr nötig nur in extremen Trockenperioden

Pflanzzeit: Frühjahr (April-Juni), Zwiebeln im Herbst (Oktober-November)

Rückschnitt: bodeneben im Spätwinter (Januar-Februar) vor Austrieb der Geophyten, Schnittgut abräumen

Pflege: erstes Jahr 4-6 Pflege-Kontrollgänge (10-15 min), Folgejahre 2-4 Pflege-Kontrollgänge (ca. 7min)

Mindestgröße: ca. 25m²

Mittlere Pflanzanzahl: 6-9 Stück/ m²

Art	Funktion	verw.-relev. Eigenschaften	Stückzahl auf 100 m ²	Anteil in %	Beschreibung	Alternative
1. Gerüstbildner		# DIV/0!				
<i>Agastache</i> 'Blue Fortune'		L, zS	15	#DIV/0!	blauviolette Blüte, 90-110 cm, sterile, langblühende Hybride, gute Struktur der Blüten- und Samenstände, kurzlebig	<i>Elsholtzia stauntonii</i> (Halbstrauch, ausdauernd, spät blühend)
<i>Baptisia australis</i>		Sol, L, Cs	10	#DIV/0!	blaue Schmetterlingsblüten im Juni/ Juli, wachsig grau-grünes Laub, trockenheitsverträglich	
<i>Eryngium yuccifolium</i>		W, Sol, zS	10	#DIV/0!	auffällige weiße, kugelige Blütenstände auf verzweigten Stengeln Ende Juli bis August, yuccaartiges bestacheltes blau-graues Laub, Strukturpflanze, 90-150 cm hoch	
<i>Panicum virgatum</i> 'Hänse Herms'		Sol, H, L, zS	15	#DIV/0!	schleierartige Rispenblüten im August-September, rötlich überlaufene Blätter ab August, schön zu <i>Rudbeckia</i> , leuchtend rotbraune Herbstfärbung, 80-100 cm	<i>Panicum virgatum</i> 'Heavy Metal'
2. Aspektbildner		# DIV/0!				
<i>Amorpha canescens</i>		L, H	75	#DIV/0!	blauviolette Blütenähren im Juli-September, grausilbriges Laub, kleiner Halbstrauch, 60-90 cm hoch, tief reichende, stickstofffixierende Wurzeln, äußerst trockenheitstolerant, langlebig, gelbe Herbstfärbung	
<i>Aster oblongifolius</i>			10	#DIV/0!	Herbst-Aspektbildner, blaue Blüten im August/September, lanzettliche, duftende Blätter, buschiger Wuchs bis 60 cm, verträglich	<i>Aster n.a.</i> 'Purple Dome'
<i>Aster turbinellus</i>			15	#DIV/0!	Herbst-Aspektbildner, blaue Blüten im August/September, lanzettliche Blätter, verträglich	<i>Aster n.a.</i> 'Purple Dome'
<i>Echinacea pallida</i>		zS	80	#DIV/0!	Frühsommer-Aspektbildner, Korbblüten mit schmalen, auffälligen, hängenden, dunkelrosa Zungenblüten im Juni-August, weißer Pollen, 60-90 cm, trockenheitsverträglich, raubehaarte, schmale Blätter	
<i>Echinacea purpurea</i>		zS	65	#DIV/0!	purpurfarbene Zungenblüten mit rotoranger Mitte im Juli-September, 60-120 cm hoch	
<i>Liatris spicata</i>		L, zS	50	#DIV/0!	lila Blütenähren im Juli/August, lineare Blätter, bevorzugt eher feuchtere Böden, 80-90 cm, anpassungsfähig	<i>Liatris scariosa</i>
<i>Monarda fistulosa</i> ssp. <i>fistulosa</i> var. <i>menthaefolia</i>		zS	45	#DIV/0!	Frühsommer-Aspektbildner/ Begleiter, lilarosa Blüten Ende Juni bis Anfang August, 40-60 cm hoch, weitgehend unbekanntes Unterart von <i>M. fistulosa</i>	
<i>Tradescantia ohlensis</i>		Cs	75	#DIV/0!	tiefblaue Blüte im Juni-Juli, 60-120 cm, nur vormittags geöffnet, zieht häufig im Sommer ein, grau-grünes, lineales Laub, trockenheitsverträglich	
3. Begleiter		# DIV/0!				

<i>Artemisia ludoviciana</i> var. <i>albula</i> 'Silver Queen'			15	#DIV/0!	auffälliges, weißfilziges Laub, bis 75 cm	
<i>Oenothera pilosella</i>		W, H	30	#DIV/0!	hellgelbe Blüten im Juni/Juli, durch kurze Ausläufer langsam flächig ausbreitend, purpur-rötl. Herbstfärb., wintergrüne Rosetten	<i>O. tetragona</i> 'Sonnenwende'
<i>Oligoneuron album</i> (= <i>Aster ptarmicoides</i>)			200	#DIV/0!	Bodendecker, weiße Blüte im Juni-August, lockerer, halbkugeliger Wuchs, horstig, bis 40 cm, trockenheitsverträglich, auch für sandige Böden	
<i>Parthenium integrifolium</i>			20	#DIV/0!	weiße Blütenköpfchen in Rispen Ende Juni bis September, grobe Blatttextur, wichtige Prärieart, trockenheitsverträglich, 90 cm, schön zu <i>Liatris</i>	
<i>Penstemon digitalis</i> 'Huskers Red'		W, Cs	30	#DIV/0!	viele rosa-violette, innen weiße Blüte im Mai/Juni, wintergrüne Rosetten, 30-40 cm	
<i>Pycnanthemum pilosum</i>		zS	10	#DIV/0!	weiße Lippenblüten Ende Juli bis September, graugrünes Laub mit Minzeduft, 60-80 cm hoch, schöne Samenstände	<i>Gaura lindheimeri</i>
<i>Pycnanthemum tenuifolium</i>		Cs, zS	15	#DIV/0!	weiße Lippenblüten im Juni-September, frischgrünes, nadelartiges Laub, horstig, 30-50 cm, Samenstände zierend	
<i>Rudbeckia fulgida</i> var. <i>deamii</i>		zS	5	#DIV/0!	gelbe Blüten Mitte Juli bis September, trockenheits-verträglicher und breiteres Laub als <i>R. fulgida</i> var. <i>speciosa</i> , helleres Gelb und spätere Blüte als <i>R. hirta</i> , 100 cm, auch leichte Beschattung ertragend	
<i>Solidago caesia</i>			10	#DIV/0!	hellgelbe Blüten entlang des Stengels im August/September, dunkelgrünes Laub, 30-120 cm hoch, in trockenen Wäldern	
Gesamt:			800	#DIV/0!		
5. Geophyten						
<i>Allium cernuum</i> 'Majus'		W, Cs	500		nickende, purpurrosa Blütendolden im Mai/Juni, bis 60 cm, lineales Laub, schön in Massen, vegetative Ausbreitung, Versamung?	
<i>Allium unifolium</i>		Cs	500		frühblühende amerikan. Lauchart, hellrosa Blüte im Mai/ Juni, 20-30 cm	
<i>Camassia leichtlinii</i> 'Caerulea'			50		blaue Blüte im Mai, zieht ab Ende Juni völlig ein, 70-90 cm hoch	
<i>Camassia quamash</i>			500		ultramarinblaue Blüten Ende April bis Mitte Mai, 30 cm hoch, liebt frühjahrsfrische Standorte, in der Natur oft in Massen vorkommend, ausdauernd?	
<i>Narcissus triandrus</i> 'Hawera'			300		hellgelbe kleine Blüte Mitte April bis Mitte Mai, 20 cm hoch, schmales Laub, später Austrieb, duftend, Wiesenpflanze	
<i>Narcissus triandrus</i> 'Petrel'			300		elfenbeinweiße Blüten im April, 35 cm hoch, schmales Laub	